

Via Salaria 187 a/b  
00015 Monterotondo Scalo (RM)  
**T:** 06.9069197 06.9069201  
info.monterotondo@medicentergroup.it

Via Tiburtina 431  
00157 Roma  
**T:** 06. 4381146  
info.tiburtina@medicentergroup.it

Via Carlo Guglielmi 45  
05100 Terni  
**T:** 0744. 40 29 29  
info.terni@medicentergroup.it

**MEDICENTER GROUP Srl** - Sede Legale: Via Salaria 187 a/b - 00015 Monterotondo Scalo (RM)  
C.F. - P.Iva e Registro Imprese di Roma 04816131009 | Capitale sociale € 26.000,00 I.V. | pec: medicentergroup@pecposta.it

## PREPARAZIONE RISONANZA MAGNETICA DELLA MAMMELLA

La Risonanza Magnetica della mammella può essere effettuata senza e con mezzo di contrasto.

Ci sono alcune limitazioni all'effettuazione dell'esame:

**Le pazienti che assumono la pillola anticoncezionale**, per poter fare la RM mammaria devono sospendere l'assunzione della "pillola", aspettare le mestruazioni e poi fare l'esame tra il 7° ed il 14° giorno del ciclo

**Le pazienti in menopausa**, possono effettuare l'esame in qualunque momento.

**Le pazienti che assumono una terapia ormonale** sostitutiva la devono interrompere 2 mesi prima dell'esame.

**Le pazienti che hanno subito un intervento chirurgico** alla mammella, possono eseguire la RM solo se sono trascorsi almeno 6 mesi dall'intervento chirurgico.

**Le pazienti che hanno subito una radioterapia** possono eseguire l'esame RM dopo 6 mesi dalla fine del trattamento radioterapico.

**Le pazienti che allattano** devono sospendere l'allattamento solo per 24 ore dopo l'effettuazione dell'esame. La paziente deve inoltre effettuare una estrazione del latte del giorno dell'esame con il tiralatte senza utilizzarlo.

**Le pazienti allergiche** devono prendere contatti con il nostro call center per parlare con un sanitario che valuterà la possibilità di dare una terapia desensibilizzante.

**L'esame va effettuato dal 7° al 14° giorno** del ciclo per evitare che la congestione delle mammelle che fisiologicamente si manifesta prima del ciclo, possa alterare il rapporto segnale/rumore e rendere più difficile la diagnosi.

Al fine di concordare un appuntamento nel periodo corretto, **si consiglia di chiamare la segreteria il primo giorno di mestruazione.**

Il giorno dell'esame ( se da effettuare con mezzo di contrasto) la paziente deve mantenere un digiuno di almeno 6 ore e portare i risultati della **creatininemia** (un esame del sangue da eseguire in laboratorio)